

نسبة انخفاض الخضار السنوية (-٣٪) وهي الأعلى، تليها الأشجار المثمرة (-٦٨، ٠٪) ثم الحبوب (-١٦، ٠٪).

أما بالنسبة للتبغ فقد ارتفعت مساحته بمعدل سنوي يقدر بـ ٦، ٤٪.

٣- فيما يتعلق بالإنتاج فقد تناقص محصولا الحبوب والخضار للفترة ما بين

١٩٥٧ و١٩٨٥، وبلغ المعدل (-٤، ٣٪) سنوياً، للخضار (-٦، ٠٪)

للحبوب، أما الأشجار المثمرة والتبغ فقد ارتفع انتاجها فبلغ ٧، ٤٪ للتبغ و٩، ٢٪ للأشجار المثمرة.

ومما تقدم يمكن القول أنه على الرغم من انخفاض المساحات المزروعة


لمعظم المحاصيل للفترة ما بين ١٩٥٧ - ١٩٨٥م، إلا أن المحصلة النهائية للإنتاج

والإنتاجية كانت إيجابية بصورة إجمالية في السنة الأخيرة.

ج- المحاصيل الزراعية:

يزرع في محافظة الخليل ثلاث مجموعات من المحاصيل الزراعية وهي

المحاصيل الحقلية، الخضار، الأشجار المثمرة.



شكل رقم (٨)